



MEASLES

CASES ARE ON THE RISE!

Measles is a highly contagious disease that can cause fever, cough, runny nose, red and watery eyes, and a rash from head to toe. It can lead to severe illness and in many cases, **hospitalizations**.

Measles can be spread by droplets in the air, and being around infected persons. Everyone who is not vaccinated is at risk of contracting Measles, so protect yourself and your family by getting vaccinated today.

HOW CAN CHILDREN BE PROTECTED?

Children should start their MMR (measles, mumps, rubella) vaccine series at age 12-15 months, and finish at age 4

If you are traveling, inquire with your child's pediatrician about receiving the vaccine earlier!

HOW CAN ADULTS BE PROTECTED?

Vaccinated between 1963 -1968? You May need a booster. Call or visit your local pharmacy today to receive the vaccine

DON'T RECALL WHEN YOU WERE VACCINATED?

Call your primary care clinician to get a blood test to check your immunity or Call or visit your local pharmacy today to receive the vaccine. It is not harmful to receive an extra dose of the vaccine if you're unsure!

NEVER VACCINATED?

If you have never received the MMR vaccine, now is the time! Call or visit your local pharmacy today to receive the vaccine.



SITES: DANIELSON. NORWICH. PUTNAM. WILLIMANTIC
SCHOOL BASED HEALTH CENTER: PUTNAM
MOBILE HEALTH UNIT

GENHEALTH.ORG



REV. 03.20.25



SARAMPIÓ

¡ESTÁN AUMENTANDO LOS CASOS!

El sarampión es una enfermedad muy contagiosa que puede causar fiebre, tos, congestión nasal, enrojecimiento y lágrimas en los ojos, y una erupción de la cabeza a los pies. Puede agravarse y, en muchos casos, requerir hospitalizaciones.

El sarampión se transmite por gotas que están en el aire y cercanía de personas infectadas. Todas las personas que no están vacunadas están bajo riesgo de contraer sarampión. Por eso, protéjase a sí mismo y a su familia vacunándose hoy.

¿CÓMO SE PUEDE PROTEGER A LOS NIÑOS?

Los niños deben comenzar la serie de vacunas SPR (sarampión, paperas y rubeola) entre los 12 y los 15 meses de edad y finalizarla a los 4 años.

Si piensa viajar, consulte al pediatra de su hijo si puede darle la vacuna antes!

¿CÓMO SE PUEDE PROTEGER A LOS ADULTOS?

¿Se vacunó entre 1963 y 1968? Puede que necesite un refuerzo. Llame a su farmacia local o visítela hoy para recibir la vacuna.

¿NO RECUERDA CUÁNDO SE VACUNÓ?

Llame a su médico clínico de cabecera para hacerse un análisis de sangre y verificar su inmunidad. O bien llame a su farmacia local o visítela hoy para recibir la vacuna. ¡No hace daño recibir una dosis extra de la vacuna si no está seguro!

¿NUNCA SE VACUNÓ?

Si nunca recibió la vacuna SPR, ¡ahora es el momento! Llame a su farmacia local o visítela hoy para recibir la vacuna.